

問) $p^q + q^p + 7$ を pq で割り切れるようにしたい。ただし、 p, q は素数とする。

(1) $p = q$ とすると $p^q + q^p + 7 = 2p^p + 7 \equiv 7 \pmod{p^2}$

7 は素数の 2 乗で割り切れることはない。ゆえに $p \neq q$

(2) $p > q$ とし、とりあえず $q = 2$ とおくと

$$p^q + q^p + 7 = p^2 + 2^p + 7 = p^2 + 2(2^{p-1} - 1) + 9 \text{ より } p^2 + 2^p + 7 \text{ が } 2p \text{ で割り切れるためには、}$$

フェルマーの小定理 $2^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ を使って、さらに $p^2 + 2^p + 7$ は偶数なので、 $9 \equiv 0 \pmod{p}$ が必要である。

ゆえに、 $p = 3$ となる。 $(p, q) = (3, 2)$

(3) $p > q > 3$ とし $p^q + q^p + 7 = p(p^{q-1} - 1) + q(q^{p-1} - 1) + p + q + 7$ と変形して

フェルマーの小定理 $p^{q-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 、 $p^{q-1} - 1 \equiv 0 \pmod{q}$ より、 $p^q + q^p + 7 \equiv p + q + 7 \equiv 0 \pmod{pq}$ がいえればよい。

$$p + q + 7 \geq pq, \quad pq - p - q \leq 7, \quad (p - 1)(q - 1) \leq 8$$

明らかに $p < 7$ なので 条件 $(p - 1)(q - 1) \leq 8$ を満たすものは、 $(p, q) = (5, 3)$ で

さらに、 $p + q + 7 = 5 + 3 + 7 = 15 \pmod{15}$ より、これも条件を満たす。

対称形なので、 $(p, q) = (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)$ が答えである。